


# ТРИОКИДС БЭБИ

## Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства



**Торговое название:** Триокидс бэби.

**Международное непатентованное название:** поливитамины.

**Лекарственная форма:** капли для приема внутрь.

**Состав:** 1 мл раствора содержит:

**Действующие вещества:**

Витамин А ..... 300 мкг (1000 МЕ)

Витамин D3 ..... 10 мкг (400 МЕ)

Витамин С ..... 35 мг

**Вспомогательные вещества:** стерильная вода 990 мг, сорбат калия 20 мг.

**Фармакотерапевтическая группа:** мультивитамины.

**Код ATХ:** A11JA.

**Фармакологическое действие:**

Комбинированный препарат, содержащий комплекс витаминов, необходимых детям первого года жизни. Действие определяется свойствами витаминов, входящих в состав препарата.

**Витамин А (ретинол):**

Способствует правильному росту и развитию организма ребенка. Играет важную роль в формировании иммунной системы, повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям. Необходим для обеспечения нормальной зрительной функции. Является важнейшим компонентом антиоксидантной защиты организма.

**Витамин D3 (колекальциферол):**

Необходим для нормального формирования костей и зубов в растущем организме. Поддерживает уровень неорганического фосфора и кальция в плазме, и повышает всасывание кальция в тонкой кишке, предупреждая развитие ракита и остеомаляции.

**Витамин С (аскорбиновая кислота):**

Играет важную роль в образовании белка, называемого коллагеном, который составляет значительную часть материала соединительных тканей, костей, хрящей, зубов и кожи. Имеет важное значение для функционирования иммунокомпетентных клеток крови, способствует повышению сопротивляемости организма к различным инфекциям. Аскорбиновая кислота способствует всасыванию неорганического железа из пищеварительного тракта, кроме того обладает антиоксидантными свойствами.

**Показания к применению:**

Детям с первых дней жизни до 1 года:

- профилактика недостаточности витаминов А, D3 и С;
- профилактика ра�ахита у детей;
- в качестве средства для повышения сопротивляемости организма к инфекциям.

Способствует правильному формированию и развитию опорно-двигательного аппарата и органов, обеспечивающих рост ребёнка.

**Противопоказания:**

индивидуальная непереносимость компонентов препарата, гиперкальциемия (в связи с наличием в составе колекальциферола);

• беременность и период лактации.

**Состорожность:** при почечной недостаточности и заболеваниях сердца.

**Способ применения и дозы:**

Детям в возрасте до 1 года - по 1 мл (25 капель) в сутки сезонными курсами по 2-3 месяца. В летнее время года дозу можно уменьшить до 0,5 мл (13 капель) в сутки.

Продолжительность приема и курс могут быть изменены по рекомендации врача.

Принимать одновременно с приемом пищи или сразу после него.

**Побочные действия:**

Возможны расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта в том числе желудочно-кишечный дискомфорт, диарея, тошнота, запор.

При индивидуальной непереносимости компонентов препарата возможны аллергические реакции в виде зуда или крапивницы.

**Передозировка:**

Симптомы передозировки - потеря аппетита, сухость слизистой оболочки полости рта, полиурia, диарея.

При возникновении симптомов передозировки необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу для назначения соответствующего лечения. Лечение симптоматическое.

**Взаимодействия с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении противосудорожные средства, рифамицин, неомицин снижают абсорбцию ретинола и колекальциферола.

Одновременный прием витамина D с витамином А снижает риск развития передозировки последнего.

Аскорбиновая кислота улучшает всасывание в кишечнике препаратов железа.

**Особые указания:**

Во время приема препарата не рекомендуется прием других поливитаминных препаратов во избежание передозировки. Не следует превышать рекомендованную суточную дозу.

**Форма выпуска:**

Капли для приема внутрь 30 мл в стеклянном флаконе с крышкой-пипеткой. Один флакон вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 15°C. Хранить в недоступном для детей месте. После вскрытия следует хранить в холодильнике. Не замораживать.

**Срок годности:**

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.

Произведено для:

LADY HEALTHCARE LLP

Лондон, Великобритания



Производитель:

МНС Биткисел ве Саглик Урунлари Ширкети

Бурса, Турция